Camposimyia als neuer Name für Camposia

(Diptera, Chironomidae)

Von Friedrich Reiss

Zoologische Staatssammlung München

Bei der Zusammenstellung aller nominellen Chironomidengattungen durch Herrn Patrick Ashe, University of Dublin, zeigte sich, daß der für die südchilenische Chironomidenart echinata eingeführte Gattungsname Camposia (Reiss 1972) präokkupiert ist. Der Name Camposia wurde erstmals von Desmarest (1823: 259) für eine Gattung der Crustacea (Reptantia) benutzt.

Ich schlage daher Camposimyia nom. nov. für Camposia Reiss, 1972 nec Camposia Desmarest, 1823 vor.

Literatur

DESMAREST, A. G. 1823: Malacostracés. – Dictionaire des Sciences naturelles 28: 138–425, Straßburg, Paris

Reiss, F. 1972: Die Tanytarsini (Diptera, Chironomidae) Südchiles und Westpatagoniens. Mit Hinweisen auf die Tanytarsini-Fauna der Neotropis. – Stud. neotrop. Fauna 7: 49–94

> Anschrift des Verfassers: Dr. Friedrich Reiss, Zoologische Staatssammlung Maria-Ward-Str. 1b, D-8000 München 19

Angenommen am 29.6.1981